


Entwicklung und Gestaltung von Kulturlandschaften

Einrichtung eines Beweidungssystems
entlang des Westwalls unter
landwirtschaftlichen Gesichtspunkten

Ostfriesisches Milchschaaf

**400 – 500 Liter Milch mit 6% Fett
6 kg Wolle schwarz und weiß
gute fettarme Fleischqualität
saisonales Bocken Sept. bis Nov.
Trächtigkeitsdauer 5 Monate
Lamm Zeit Feb. Bis April
Durchschnittlich 1,8 bis 2,4 Lämmer**



Dietmar Johnen, MdL - 18.10.2012



Dietmar Johnen, MdL - 18.10.2012



Dietmar Johnen, MdL - 18.10.2012



- Gesamtgröße: 1,4 ha
- 600 m langer Fußweg
- 54,13 ar Höckerlinie mit Beton
- Krautstreifen entlang der Höckerlinie
- Als Ersatzmaßnahme ausgewiesen

Ersatzmaßnahmen

- Extensive Bewirtschaftung
- Kein Einsatz von Düngemitteln
- Kein Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln
- Weide- und Schnittnutzung in Kombination möglich
- Von Vorteil ist der späte Schnittzeitpunkt

Der Schnitt sollte zur Heugewinnung auf der Fläche verbleiben, damit der Samenausfall der Gräser- und Blütenpflanzen auf der Fläche verbleibt.

Anschließend ist das Mähgut von der Fläche zu räumen

Ersatzmaßnahmen

- Die Maßnahmen müssen in den betrieblichen Ablauf passen
- Zahlungsansprüche bzw. Flächenprämien können für die Krautstreifen aktiviert werden
- **Folgekosten**

Weg für die naturschutzfachlichen Zielsetzungen und landwirtschaftlichen Umsetzungsmöglichkeiten

→ Damit **keine Folgekosten** für die Pflege und damit für die Gemeinde entstehen; **keine Pacht**;
Zaununterhaltung



Dietmar Johnen, MdL - 18.10.2012

Problematik

- Verkehrssicherungspflicht
- Bock-Problematik und Wanderer
- Hinweis – Betreten auf eigene Gefahr

Lösung:

- Geführte und angemeldete Wanderung
- Den Bock kurzzeitig einpferchen

Keine Beeinträchtigung

- Wildtiere, wie Dachs und Fuchs
- Vögel, wie der Neuntöter
- Rehwild

Regionale Vermarktung

Interesse zeigen:

- Metzger
- Handel
- Bauern
- Tourismus



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit